

Les découvertes de séropositivité VIH chez les migrants en France

Unité VIH-IST-VHC-VHB chronique

Département des maladies infectieuses

Institut de veille sanitaire

Réunion du 19 novembre 2009




L'indicateur retenu = le pays de naissance

Les personnes nées à l'étranger ~ les migrants

La proportion de migrants parmi les découvertes de séropositivité VIH diminue au cours du temps

- En 2003, les migrants représentent 59% des découvertes de séropositivité




N = 7 400

■ Migrants

■ Français


- En 2008, ils représentent 48% des découvertes de séropositivité
- **environ 3 000 migrants ont découvert leur séropositivité en 2008**



N = 6 500

La proportion de migrants parmi les découvertes de séropositivité VIH diffère entre femmes et hommes, 2008


Femmes




Pays de naissance

- Europe
- Asie
- Af. du Nord
- Amérique
- Af. subsah.
- France

Hommes




La proportion de migrants parmi les découvertes de séropositivité VIH varie par région, 2008



Le taux de découvertes de séropositivité en 2008 est le plus élevé chez les migrants d'Afrique subsaharienne

Taux de découvertes de séropositivité
/ 100 000





Données au 31 décembre 2008 corrigées pour les délais et la sous-déclaration, rapportées à la population au 1^{er} janvier 2005 (INSEE)

Ce taux élevé chez les migrants d'Afrique subsaharienne reflète en partie les flux migratoires en provenance de pays à forte prévalence ...

Cameroun,

Côte d'Ivoire, Mali, Congo, RDC,

Sénégal, ...



Source : Onusida, 2007




... mais pas seulement : des indicateurs en faveur de contaminations en France

Parmi les personnes nées en Afrique subsaharienne ayant découvert leur séropositivité VIH en 2008 :

- 14 % se sont contaminées dans les 6 mois précédant leur diagnostic
- 20 % sont infectées par le VIH-1 de sous-type B, présent en Europe de l'Ouest et quasi-inexistant en Afrique

Tendances des découvertes de séropositivité VIH chez les migrants, selon leur pays de naissance





1. Diminution des découvertes de séropositivité VIH chez les migrants d'Afrique subsaharienne en 2003-2007 expliquée par une diminution de l'incidence

Estimations d'incidence :


Diminution de l'incidence observée entre 2003 et 2008 chez les personnes de nationalité étrangère contaminées par rapports hétérosexuels



2. Diminution des découvertes de séropositivité VIH chez les migrants d'Afrique subsaharienne expliquée par une modification du recours au dépistage ?

- Recours important au dépistage au cours de la vie : enquête CDAG 2004 (69%), KABP migrants 2005 (65%)
- Pas de données de tendances spécifiques à la population africaine
- Contexte politique défavorable (lutte contre l'immigration)


3. Diminution des découvertes de séropositivité VIH chez les migrants d'Afrique subsaharienne non expliquée par une modification des flux migratoires



Source INED : à partir de la délivrance des titres de séjour (ministère de l'immigration)



Caractéristiques des migrants découvrant leur séropositivité VIH en 2008 (migrants d'Afrique subsaharienne versus les « autres »)






Sexe et âge des migrants découvrant leur séropositivité VIH en 2008

- Migrants d'Afrique subsaharienne
58 % de femmes, d'âge moyen 33,7 ans (39,6 chez les hommes)
- Migrants « autres »
33 % de femmes, d'âge moyen 38,7 ans (40,2 chez les hommes)


Mode de contamination des migrants découvrant leur séropositivité en 2008

Hommes



migrants d'Afrique subsaharienne


Femmes




Homo/bisexuel

UDI

Hétérosexuel




migrants « autres »




Diminution des découvertes de séropositivité à un stade de sida chez les migrants...


Migrants d'Afrique subsaharienne



Migrants « autres »



... mais encore une proportion importante de découvertes de séropositivité à un niveau d'immunodéficience avancé en 2008



Synthèse

- Stabilisation du nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les migrants en 2008 (notamment chez les migrants d'Afrique subsaharienne), après une diminution constante depuis 2003
- Des tendances expliquées par :
 - une diminution de l'incidence
 - avec néanmoins peut-être une diminution du recours au dépistage de cette population (non objectivée)
- Diminution des dépistages à un stade clinique de sida, néanmoins presque 60% des découvertes de séropositivité chez les migrants nécessitent la mise en route d'un traitement antirétroviral
- Une partie des contaminations chez les migrants d'Afrique subsaharienne se produisent en France d'où la nécessité de poursuivre des campagnes de prévention ciblées
- Ne pas oublier la situation particulière dans les DFA, très liée à une forte immigration en provenance d'Haïti et d'Amérique du sud ...



Remerciements

- L'ensemble des biologistes et médecins qui participent à la surveillance du VIH/sida
- Les médecins inspecteurs de santé publique des Ddass et leurs collaborateurs
- Le Centre national de référence du VIH :
Francis Barin, Sylvie Brunet, Damien Thierry